

Ficha Técnica

Porcilis[®]

Ileitis



**BACTERINA PARA EL CONTROL DE LA ILEITIS CAUSADA POR
Lawsonia intracellularis EN CERDOS****FÓRMULA:**

Cada dosis de 2ml contiene:

Cultivos inactivados de *Lawsonia Intracellularis*, SPAH08 1.2 RP*

Vehículo c.b.p

* Potencia Relativa

DESCRIPCIÓN:

Porcilis® ileitis es una bacterina inactivada contra la enteritis proliferativa porcina. La vacuna contiene células inactivadas de *L. intracellularis* en un adyuvante de aceite en agua. Las células bacterianas *L. intracellularis* utilizadas para la fabricación de Porcilis® ileitis se producen mediante un co-cultivo de la cepa de producción *L. intracellularis* en una línea celular McCoy. Una vez cultivadas, las células McCoy son concentradas, sometidas a sonificación e inactivadas con etilenimina binaria. El antígeno es adyuvantado para producir la vacuna final.

INDICACIONES:

Porcilis® ileitis está indicada para utilizarse en cerdos sanos de 3 meses de edad o mayores como auxiliar para controlar la ileítis provocada por *Lawsonia intracellularis*, para reducir la colonización de *Lawsonia*, así como para disminuir la duración de la excreción fecal. Se ha demostrado que la duración de la inmunidad es de por lo menos 20 semanas.

ESPECIES DE DESTINO:

Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

La vacuna se administra a cerdos de 3 semanas de edad o mayores mediante una inyección intramuscular con una dosis de ml.

CONTRADICCIONES:

Ninguna

REACCIONES ADVERSAS:

Se han observado reacciones adversas sistémicas inmediatas en animales a los que se les ha administrado el producto. Es conveniente disminuir al máximo la manipulación de los cerdos y asegurarse de que la ventilación sea adecuada antes de iniciar la vacunación. Un número importante de cerdos puede experimentar una inflamación temporal en la zona inyectada. Esta inflamación debe remitir sin tratamiento alguno en menos de 20 días. Si ocurre una reacción alérgica, tratar al animal con epinefrina.

ADVERTENCIAS:**Advertencias para uso en animales:**

Vacune únicamente a animales sanos.

La seguridad de este producto no ha sido establecida durante la gestación o la lactancia.

Advertencias que debe tomar la persona que administra el producto médico de uso veterinario a los animales:

Se debe tener cuidado para evitar inyectarse en los dedos, manos u otras partes del cuerpo. Una inyección accidental puede provocar reacciones locales serias. Consulte a un médico de inmediato.

Interacción con otros productos médicos y otras formas de interacción:

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con cualquier otro medicamento de uso veterinario. Por lo tanto, la decisión de usar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario se debe tomar dependiendo de cada caso.

Incompatibilidades:

No se conocen.

Precauciones de Almacenamiento.

Conservese entre 2 y 7° C.

No congelar.

Protejase de lá luz.

Una vez abierto el envase, utilice todo su contenido

Mantengase fuera de la vista y el alcance de los niños y de los animales domésticos.

Deseche el frasco y sobrantes mediante incineración.

TIEMPO DE RETIRO:

21 días.

PRESENTACIONES:

100 ml/50 dosis

500 ml/250doss

1000 ml/500 dosis

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACION DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su Médico Veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Para uso veterinario exclusivamente.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

IntervetInc, OmahaNE68103 USA.

IMPORTADO Y**DISTRIBUIDO POR:****Intervet México, S.A. de C.V.**

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.

Tel.: 01 (55) 54 81 96 00

www.msd-salud-animal.com.mx